

franciscus

CORRECTIE AFSTAANDE OORSCHHELPEN

PLASTISCHE EN RECONSTRUCTIEVE CHIRURGIE
EN HANDCHIRURGIE

Inleiding

Klachten over afstaande oren komen regelmatig voor. Hierbij heeft de oorschelp een abnormale vorm. Daarnaast kan de oorschelp een afwijkende stand hebben ten opzichte van de schedel (flaporen). Dit wordt meestal veroorzaakt door een aangeboren afwijking van het kraakbeen. Dit is meestal goed te opereren. Een operatie wordt uitgevoerd vanaf de leeftijd van zes jaar.

Vorbereiding op de operatie

De operatie wordt meestal in dagbehandeling verricht: u mag dan dezelfde dag weer naar huis. De operatie vindt plaats onder algehele narcose.

Voordat u of uw kind wordt geopereerd, krijgt u een afspraak bij het Opnameplein voor preoperatieve screening. De anesthesist bespreekt tijdens dit spreekuur uw gezondheidstoestand met u. De anesthesist is tijdens uw operatie verantwoordelijk voor de verdoving.

Voor en na de operatie worden door de medisch fotograaf foto's gemaakt voor uw medisch dossier. Deze foto's kunt u zelf opvragen bij de medisch fotograaf indien de zorgverzekeraar hierom vraagt.

Let op!

- Indien u bloedverdunners gebruikt, bepaalt de anesthesist of en zo ja wanneer u deze medicatie kunt stoppen;
- Indien u rookt, is het belangrijk dat u hiermee stopt, aangezien roken slecht is voor de wondgenezing.

Operatie

Aan de achterzijde van het oor wordt een snee in de huid gemaakt. Het kraakbeen wordt waar nodig ingesneden en in model gebracht. Eventueel overtollige huid kan worden verwijderd. Vaak wordt ook de oorlel in een betere positie gebracht. De wond wordt met hechtingen gesloten. Tenslotte wordt een licht-drukkend verband om de oren en het hoofd aangebracht.

Na de operatie

Na de operatie kunt u de eerste uren last van pijn hebben. Deze pijn is met pijnstillers goed te verhelpen.

Na ongeveer vijf dagen wordt het verband op de polikliniek verwijderd. De oren zien er dan nog gezwollen en blauw uit. Heeft u niet-oplosbare hechtingen? Dan worden deze op de polikliniek verwijderd. Als oplosbare hechtingen zijn ingebracht, worden de zichtbare knooppjes ervan verwijderd. Oplosbare hechtingen kunnen tijdelijk irritatie geven.

Nadat het verband is verwijderd, mag het haar voorzichtig worden gewassen en achter de oren worden droog geföhnd. Na twee weken kunt u weer sporten. Het wordt aangeraden te wachten met het beoefenen van contactsport tot zes weken na de operatie.

Complicaties

Een infectie komt zelden voor, een nabloeding een enkele keer. Bij nabloeden en extreme pijn wordt u dringend aangeraden direct contact op te nemen met de polikliniek Plastische Chirurgie of buiten kantooruren met de afdeling Spoedeisende Hulp.

Het litteken aan de achterzijde van het oor en rond de oorlel is na een jaar nauwelijks meer te zien. Sommige mensen vertonen een heftige littekenreactie. De oorzaak hiervan is een erfelijke aanleg.

Heel soms keert het oor terug in de oude positie en is een heroperatie nodig. De kans hierop is groter wanneer het oor

uitsluitend met hechtingen in de juiste vorm wordt gezet (zonder dat het kraakbeen wordt ingesneden).

Resultaat van de operatie

Kraakbeen is in principe maar in één richting om te buigen en kan niet goed in meerdere richtingen in een nieuwe vorm worden gebracht. Een volledige perfectie en symmetrie (gelijkheid) in vorm en stand mag dus niet worden verwacht. U kunt tijdelijk of blijvend minder gevoel hebben in de oorschelp.

Een operatie waarbij het oor kleiner wordt gemaakt raden wij af, omdat na een oorverkleining altijd littekens overblijven, die goed zichtbaar zijn.

Veel mensen die een correctie van afstaande oorschelpen ondergaan, zijn na de operatie erg tevreden. Doordat de stand en/of de vorm van de oorschelpen verbeterd is ervaren de meeste mensen hun probleem als verholpen en vinden zij het ondanks het ongemak van de operatie toch waard.

Vergoeding

De kosten van een oorcorrectie worden door de zorgverzekering niet altijd vergoed. Als de plastisch chirurg de operatie noodzakelijk vindt, wordt een aanvraag tot vergoeding ingediend bij uw zorgverzekeraar. Als deze aanvraag door de zorgverzekeraar wordt afgewezen, worden de kosten voor de operatie niet vergoed. U kunt ervoor kiezen om de operatie dan zelf te betalen.

Heeft u vragen?

Bekijk voor meer informatie onze website www.franciscus.nl.

Bent u op zoek naar informatie over uw persoonlijke gegevens of afspraak? Bekijk dan eerst uw patiëntenportaal via www.mijnfranciscus.nl.

Heeft u vragen over uw medicijnen of een andere medische vraag? Stel deze via de berichtenservice aan de polikliniek via BeterDichtbij.

Wilt u een medewerker spreken? Dan kunt u bellen met het Franciscus Contact Centrum via telefoonnummer 010 - 893 0000.

*September 2018
17882*